


DIPRID 350 SC
(Imidacloprid)
Insecticida Agrícola
N° de Registro: PQUA N° 930 - SENASA

Identidad del producto:

DIPRID 350 SC, es un insecticida sistémico, translaminar, el cual actúa como agnóstico sobre el receptor de acetilcolina nicotínico (nAChR) del sistema central, primero estimulando las membranas, postsinápticas y después paralizando la conducción nerviosa. Sus propiedades insecticidas no se basan en la inhibición del desarrollo sino de la activación, y subsiguiente bloqueo de impulsos nerviosos en los receptores de acetilcolina postsinápticos lo que produce la muerte de los insectos.

- **Ingrediente activo:** Imidacloprid
- **Concentración:**

Imidacloprid	350 g/L
Aditivos para completar	1 L
- **Formulación:** Suspensión concentrada.
- **Grupo Químico:** Neonicotinoide.
- **Fórmula estructural:**



- **Categoría Toxicológica:** Moderadamente Peligroso.
- **Titular del Registro:** FITOCORP S.A.C
- **Formulador:** KINYIELD INDUSTRY CO. LIMITED.



Características de uso del producto.

- Compatibilidad

DIPRID 350 SC, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Incompatible con productos alcalinos.

- Fitotoxicidad

DIPRID 350 SC, no es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

Cuadro de uso de producto, de LMR y PC.

Cultivo	Plaga		Dosis	PC	LMR
	Nombre Común	Nombre Científico	L/cil	(Días)	(ppm)
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.150-0.200	3	0.5

P.C: Periodo de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

Frecuencia de aplicación.

DIPRID 350 SC, puede ser aplicado hasta 3 veces por campaña. Cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga, previa evaluación. No aplicar en época de floración.

Condiciones y método de aplicación.

- No mezclar **DIPRID 350 SC**, con otros productos.
- Se puede utilizar un coadyuvante apropiado para mejorar la absorción de **DIPRID 350 SC**.
- Mantener una agitación continua durante el mezclado y la aplicación de **DIPRID 350 SC**, para asegurar la suspensión uniforme. Si la mezcla queda sin agitación durante un largo periodo de tiempo, agitar la mezcla durante al menos 2 minutos antes de usarla.
- Se harán aplicaciones foliares de **DIPRID 350 SC**, y se puede usar los siguientes equipos: pulverizador manual, atomizador, aspersion motorizado del tractor.

Reingreso al área tratada.

Puede reingresar al área tratada luego de 24 horas de aplicado el producto.

Cuidados y primeros auxilios

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15-20 minutos.



- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se muestre inconsciente.

Precauciones y Advertencias de Uso y Aplicación

- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice equipo de protección personal durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Manténgalo lejos del fuego y de las chispas, guárdelo en un lugar fresco y seco. No permita que reciba mucho calor ya que esto puede ocasionar cambios en su composición química.

Disposición de Envases Vacíos:

- Después de usar el contenido enjuagar el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en sitios destinados por las autoridades.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

NOTA IMPORTANTE: FITOCORP SAC garantiza la calidad del producto, sin embargo no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.