


REVENTON 250 EW
(Tebuconazole)
Fungicida Agrícola
N° de Registro: PQUA N° 1472-SENASA

Identidad del producto:

REVENTON 250 EW es un fungicida sistémico, que pertenece al grupo de los Triazoles, con acción protectante y curativa. Actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol produciendo el detenimiento del crecimiento y posterior muerte del hongo. Se aplica en pulverizaciones, previa mezcla en agua.

- **Ingrediente activo:** Tebuconazole
- **Concentración:** Tebuconazole 250g/L
Aditivos para completar 1 L
- **Formulación:** Polvo soluble.
- **Grupo Químico:** Triazoles.
- **Fórmula estructural:**

Tebuconazole



- **Categoría Toxicológica:** Ligeramente Peligroso.
- **Titular del Registro:** FITOCORP S.A.C
- **Formulador:** KINYIELD INDUSTRY CO. LTD.

Características de uso del producto.

- Compatibilidad

REVENTON 250 EW es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

- Fitotoxicidad

REVENTON 250 EW no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

Cuadro de uso de producto, de LMR y PC.

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/cil	L/Ha		
Vid	Oídium	<i>Erysiphe necator</i>	0.06-0.1	0.3-0.5	21	2.0
Espárrago	Cercosporiasis	<i>Cercospora asparagi</i>	0.25	0.5	14	0.01
Pimiento	Oídium	<i>Leveillula taurica</i>	0.2	0.6	7	0.5
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.2	0.6	14	0.2
Café	Roya del cafeto	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.25-0.3	-	30	2.0
	Ojo de gallo	<i>Mycena citricolor</i>				
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.2-0.4	0.2-0.4	35	2.0
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphyllium vesicarium</i>	0.2-0.25	0.4-0.5	21	0.05

P.C: Periodo de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

Frecuencia de aplicación.

Aplicar **REVENTON 250 EW** al observarse los primeros síntomas de la enfermedad, con un máximo de 2 aplicaciones por cultivo/campaña. En el caso de vid, especialmente al brotamiento y en el espárrago a la apertura de los filocladios, considerando en este cultivo un intervalo entre aplicaciones de 15 a 30 días.

Condiciones y método de aplicación.

- Aspersión foliar.
- Aplicaciones de alto volumen mediante equipo de aplicación terrestre debe considerar el uso más de equipo de protección personal. Puede ser aplicada con mochila manual, mochila a motor, pulverizadores, bombas a motor, etc.
- Una vez terminado el trabajo los equipos y utensilios de aplicación deberán lavarse adecuadamente con abundante agua.

Reingreso al área tratada.

Puede reingresar al área tratada luego de 24 horas de aplicado el producto.

Cuidados y primeros auxilios

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.



- En caso de ingestión: no provocar vómito, pero no evitarlo si se produce en forma espontánea.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia y fresca durante 15 minutos.
- No existe antídoto. Tratamiento sintomático.

Precauciones y Advertencias de Uso y Aplicación

- Ligeramente irritante ocular.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido este producto debe utilizarse para contener o transportar alimentos ni agua.

Disposición de Envases Vacíos:

- Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado.
- Devuelva el envase triple lavado a un centro de acopio autorizado.

NOTA IMPORTANTE: FITOCORP SAC garantiza la calidad del producto, sin embargo no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.